




Febuxostat

Adenuric®



Inhoudsopgave

- 3 Hoe werkt febuxostat?
- 3 Voor welke aandoeningen gebruik je febuxostat?
- 3 Hoe moet ik het gebruiken?
- 3 Hoe bewaar ik febuxostat?
- 3 Welke bijwerkingen kan ik krijgen?
- 4 Zijn er controles nodig als ik febuxostat gebruik?
- 4 Kan ik febuxostat gebruiken met andere medicijnen?
- 4 Wat moet ik nog meer weten?
- 5 Meer informatie of vragen?

Disclaimer

Aan deze folder kun je geen rechten ontlene. Controleer het altijd met de tekst in de bijsluit die je bij je medicijn hebt gekregen. Neem bij vragen of onduidelijkheden over het medicijn contact op met je behandelend arts.

Hoe werkt febuxostat?

Febuxostat is een medicijn dat je krijgt voorgeschreven van je arts als je jicht hebt. Jicht is een reumatische aandoening die ontstaat doordat er urinezuurkristallen in je gewrichten 'neerslaan'. Dit gebeurt als je teveel urinezuur in je bloed hebt.

Deze 'neerslag' in de gewrichten kan leiden tot plotselinge aanvallen van gewrichtsontstekingen. Als urinezuur ook in de huid of pezen neerslaat ontstaan er soms zogenaamde jichtknobbels (jichttophi).

Febuxostat is een medicijn dat in de loop van enkele weken tot maanden de hoeveelheid urinezuur in je bloed verlaagt. Wanneer de concentratie urinezuur in het bloed laag genoeg is (meestal onder de 0,35 mmol/l), lost het urinezuur dat neergeslagen is in de gewrichten op. Op die manier voorkom je nieuwe jichtaanvallen. Ook kunnen de jichttophi verdwijnen. Het kan maanden duren voordat de neergeslagen urinezuurkristallen helemaal opgelost zijn.

Een jichtaanval kan tijdelijk erger worden wanneer je tijdens zo'n aanval met febuxostat begint. En het medicijn werkt niet tegen acute jichtaanvallen.

Om aanvallen tijdens behandeling met febuxostat te voorkomen krijg je daarom tijdens de eerste maanden dat je febuxostat gebruikt ook een medicijn voorgeschreven dat de acute gewrichtsontstekingen tegengaat. Meestal is dat colchicine. Stop colchicine alleen in overleg met je behandelaar.

Voor welke aandoeningen gebruik je febuxostat

Je arts schrijft febuxostat voor als je de diagnose 'jicht' hebt gekregen en als:

- je meer dan twee keer per jaar last hebt van een jichtaanval
- je jichtknobbels hebt
- je gewrichten door de eerdere jichtaanvallen beschadigd zijn geraakt

Meestal krijg je febuxostat voorgeschreven wanneer bij jou het eerste keus medicijn (allopurinol) geen optie is, het (te veel) bijwerkingen geeft of onvoldoende werkzaam is gebleken.

Hoe moet ik het gebruiken?

Febuxostat krijg je in de vorm van tabletten. Er zijn tabletten van 80 mg en 120 mg. Vaak begin je met een lage dosis en wordt de dosis langzaam verhoogd tot het urinezuur in je bloed voldoende is gedaald. Je arts bespreekt met jou welke dosis je gaat gebruiken.

Hoe bewaar ik febuxostat?

De febuxostat tabletten bewaar je in de originele verpakking op een droge plaats bij een huiskamertemperatuur die onder de 30°C ligt.

Welke bijwerkingen kan ik krijgen?

De apotheker geeft je altijd een bijsluiter mee. Lees deze bijsluiter goed. Je leest in de bijsluiter een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen, van zeer vaak tot zeer zelden. Het is mogelijk dat je een bijwerking krijgt, maar dat hoeft niet.

Hieronder lees je welke belangrijke bijwerkingen kunnen voorkomen bij febuxostat gebruikers:

- Hoofdpijn
- Maag- en darmklachten (zoals diarree en misselijkheid)
- Huiduitslag en vocht vasthouden (oedeem)
- Bijwerkingen van organen: bijwerkingen die je zelf niet merkt maar je arts via bloedonderzoek wel in de gaten houdt, zoals leverfunctietests en verlaagde bloedcellen.

- Allergische reacties: wanneer je overgevoelig bent voor febuxostat kun je een allergische reactie krijgen. Denk aan (nieuwe) huidafwijkingen, koorts of benauwdheid. Neem dan zo snel mogelijk contact op met je huisarts, reumaverpleegkundige en/of behandelaar. Dit soort overgevoeligheidsreacties treden meestal op tijdens de eerste 6 tot 8 weken van de behandeling.

Zijn er controles nodig als ik febuxostat gebruik?

Je arts zal regelmatig een bloedtest doen om te controleren of het urinezuur voldoende is gedaald en de febuxostat dus goed werkt. Ook controleert je arts je bloed tijdens de behandeling op bijwerkingen die in het bloed zichtbaar zijn. Dit zal in het begin vaker zijn dan wanneer je het medicijn al langer gebruikt.

Kan ik febuxostat gebruiken met andere medicijnen?

Febuxostat gebruik je doorgaans veilig naast de meeste andere geneesmiddelen. Er zijn een paar uitzonderingen, vertel het dus altijd aan je arts en je apotheker welke medicijnen je gebruikt of als er iets aan je medicijngebruik verandert.

Febuxostat mag je NIET combineren met 6-mercaptopurine, azathioprine en/of didanosine vanwege de kans op ernstige bijwerkingen.

Het gelijktijdige gebruik met theofylline wordt afgeraden.

Het gebruik van febuxostat samen met rifampicine, carbamazepine, fenytoïne, fenobarbita en ritonavir, kan leiden tot een verminderde werking van febuxostat.

Wat moet ik nog meer weten?

Alcohol Er is geen bezwaar als je (matig) alcohol gebruikt tijdens de behandeling met febuxostat. Je doet er goed aan om alcoholische dranken die veel urinezuur bevatten, zoals bijvoorbeeld bier, te vermijden. Die kunnen namelijk een jichtaanval uitlokken.

Autorijden Er is geen bezwaar tegen autorijden, fietsen, besturen van een scootmobiel of machine tijdens het gebruik van febuxostat.

Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen Ga je naar de tandarts voor een ingreep of word je geopereerd? Geef dan aan dat je febuxostat gebruikt zodat de (tand)arts zo nodig maatregelen kan nemen.

Reizen Overleg met je arts of en hoe je mag reizen. Bij reizen naar het buitenland is het raadzaam een actueel overzicht van je medicijnen mee te nemen, het medicijnpaspoort. Daarin staat dat je febuxostat gebruikt. Dit paspoort kun je krijgen bij je apotheek of eventueel bij je behandelaar.

Vaccinaties Je kunt je zonder problemen laten vaccineren tijdens het gebruik van febuxostat.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding Heb je een kinderwens of ben je (onverwacht) zwanger, vertel dit dan aan je arts. Je arts zal dan samen met jou beslissen wat je het beste aan je medicijngebruik kan veranderen als dat nodig is.

Er is weinig informatie over de effecten van febuxostat op de vruchtbaarheid en de zwangerschap. Febuxostat mag je daarom niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Het is niet bekend of dit geneesmiddel in de moedermelk overgaat. Daarom mag je geen borstvoeding geven als je febuxostat gebruikt.

Meer informatie of vragen?

Als je nog vragen hebt, stel ze dan gerust aan je reumatoloog, reumaverpleegkundige of apotheker.

Colofon

De teksten in deze medicatiefolder zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR), reumatologie netwerk Zuid-Oost Nederland en ReumaNederland.

ReumaNederland

Postbus 59091
1040 KB Amsterdam

t 020 589 64 64

info@reumanederland.nl

www.reumanederland.nl

 [Facebook.com/reumanederland](https://www.facebook.com/reumanederland)

augustus 2022

Copyright

Informatie uit deze folder hergebruiken/delen is toegestaan mits de bron (ReumaNederland) wordt genoemd.