



Iloprost

Ilomedine®



Inhoudsopgave

- 3 Hoe werkt iloprost?
- 3 Voor welke aandoeningen gebruik je iloprost?
- 3 Hoe moet ik het gebruiken?
- 3 Hoe bewaar ik iloprost?
- 3 Welke bijwerkingen kan ik krijgen?
- 4 Zijn er controles nodig als ik iloprost gebruik?
- 4 Kan ik iloprost gebruiken met andere medicijnen?
- 4 Wat moet ik nog meer weten?
- 4 Meer informatie of vragen?

Disclaimer

Aan deze folder kun je geen rechten ontlennen. Controleer het altijd met de tekst in de bijsluiter die je bij je medicijn hebt gekregen. Neem bij vragen of onduidelijkheden over het medicijn contact op met je behandelend arts.

Hoe werkt iloprost?

Iloprost is een bloedvatverwijder en remt het vastplakken van de bloedplaatjes aan de vaatwand. Hierdoor zorgt het voor een betere bloeddorstrooming, bijvoorbeeld bij slecht genezende wondjes. Iloprost is een zogenaemde prostacycline-analoon waarvan het werkingsmechanisme nog niet volledig bekend is.

Veel mensen merken direct effect: de aangedane plekken worden warmer en kunnen rood verkleuren. Soms treedt het effect geleidelijk op in de loop van een aantal weken. Bij sommige mensen werkt het medicijn helaas niet of onvoldoende.

Voor welke aandoeningen gebruik je iloprost?

Je arts schrijft je iloprost voor als je een ernstig fenomeen van Raynaud hebt of zeer slecht genezende wondjes, vaak aan handen en voeten. Dit komt onder meer voor bij reumatische auto-immuunziekten zoals systemische sclerose en systemische lupus erythematoses (SLE).

Hoe moet ik het gebruiken?

Iloprost krijg je in de vorm van een infuus. Een infuuskuur duurt meestal vijf dagen, waarin je gedurende zes uur per dag iloprost krijgt toegediend. De dosering van iloprost wordt langzaam opgehoogd en bij elke verhoging controleert de verpleegkundige je bloeddruk en polsslag. De dosering is afhankelijk van hoe je het medicijn verdraagt.

Hoe bewaar ik iloprost?

Dit is niet van toepassing voor iloprost. Je krijgt dit middel in het ziekenhuis.

Welke bijwerkingen kan ik krijgen?

De apotheker geeft je altijd een bijsluiter mee. Lees deze bijsluiter goed. Je leest in de bijsluiter een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen, van zeer vaak tot zeer zelden. Het is mogelijk dat je een bijwerking krijgt, maar dat hoeft niet.

De bijwerkingen van iloprost treden meestal op tijdens de toediening van het infuus en zijn over het algemeen daarna verdwenen.

Hieronder lees je welke belangrijke bijwerkingen kunnen voorkomen bij iloprost gebruikers:

- Gevoel van opvliegers: tijdens het infuus is het mogelijk dat er gevoel van opvliegers met warmtesensatie en blozen optreden. Evenals transpireren, misselijkheid en braken. Geef dit direct door aan de verpleegkundige zodat hij/zij met de arts kan overleggen. Vaak wordt de dosering van iloprost (infuussnelheid) dan aangepast.
- Bloeddruk daling: tijdens het infuus kan een sterke daling van de bloeddruk, een trage polsslag en/of pijn op de borst optreden. Geef dit direct door aan de verpleegkundige zodat hij/zij met de arts kan overleggen. Als het nodig is, staakt de arts het infuus tijdelijk of definitief.
- Overgevoelighedsreacties: tijdens het infuus is het mogelijk dat er een overgevoelighedsreactie optreedt. Als je last krijgt van kortademigheid, ernstige duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, hoofdpijn, koude rillingen, zwelling van de lippen, huiduitslag of jeuk, moet je dit onmiddellijk laten weten aan de verpleegkundige, zodat hij/zij meteen de arts kan waarschuwen. Als het nodig is, wordt de toediening van het infuus vertraagd of gestopt of krijg je een medicijn om deze reactie tegen te gaan.
- Maag- en darmklachten zoals verminderde eetlust, maagzuur en diarree.

- Allergische reacties: wanneer je niet goed tegen iloprost kunt, is het mogelijk dat je een allergische reactie krijgt. Denk aan huidafwijkingen, koorts of benauwdheidsklachten. Als dit tijdens het infuus gebeurt, geef dit dan direct aan bij de verpleegkundige. Ben je weer thuis en krijg je dergelijke klachten, neem dan zo snel mogelijk contact op met je huisarts, reumaverpleegkundige en/of behandelaar.

Zijn er controles nodig als ik iloprost gebruik?

Tijdens toediening van het infuus controleert de verpleegkundige regelmatig je bloeddruk en je pols. Er zijn geen extra bloedcontroles nodig voor of na het toedienen van iloprost.

Kan ik iloprost gebruiken met andere medicijnen?

Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van bloedverdunders door het effect van iloprost op de bloedplaatjes. Iloprost kan de werking van bloeddrukverlagende middelen (antihypertensiva) versterken.

Wat moet ik nog meer weten?

Alcohol Door het gebruik van alcohol kun je meer last van bijwerkingen krijgen. Daarom is het verstandiger geen alcohol te gebruiken op de dagen dat je wordt behandeld met iloprost.

Autorijden Iloprost kan de bloeddruk verlagen en daardoor klachten als hoofdpijn en duizeligheid geven. Rijd daarom geen auto, scootmobiel of fiets direct na de behandeling. Bestuur ook geen machine.

Operaties en tandheelkundige ingrepen Ga je naar de tandarts voor een ingreep of word je geopereerd? Geef dan aan dat je iloprost gebruikt zodat je (tand)arts zo nodig maatregelen kan nemen.

Reizen Overleg met je behandelaar of en hoe je mag reizen. Bij reizen naar het buitenland is het raadzaam een actueel overzicht van je medicijnen mee te nemen, het medicijnpaspoort. Daarin staat dat je iloprost gebruikt. Dit paspoort kun je krijgen bij je apotheek of eventueel bij je behandelaar.

Vaccinaties Bij een reumatische ziekte zal je behandelend arts je waarschijnlijk aanraden om een jaarlijkse griep prik te nemen. Heb je een andere vaccinatie dan de griep nodig? Overleg dan altijd van tevoren met je specialist, apotheker of huisarts.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding Heb je een kinderwens of ben je (onverwacht) zwanger, vertel dit dan aan je arts. Je arts zal dan samen met jou beslissen wat je het beste aan je medicijngebruik kan veranderen als dat nodig is.

Van iloprost is niet bekend of het de vruchtbaarheid beïnvloedt. Er is weinig informatie over de effecten van iloprost tijdens zwangerschap. Iloprost mag je daarom niet tijdens de zwangerschap gebruiken.

Het is onbekend of dit geneesmiddel in de moedermelk overgaat. Je mag daarom geen borstvoeding geven als je iloprost gebruikt.

Als je een aandoening hebt met groot risico op bloedingen Iloprost mag je niet gebruiken als je een aandoening hebt met een groot risico op bloedingen. Denk aan een maagzweer of een recente bloeding in het hoofd. Vertel het altijd aan je arts als je een andere aandoening hebt of hebt gehad.

Hartaandoeningen Heb je onlangs een hartinfarct gehad of heb je last van hartfalen? Dan is behandeling met iloprost af te raden. Vertel het altijd aan je arts als je een andere aandoening hebt of hebt gehad.

Meer informatie of vragen?

Als je nog vragen hebt, stel ze dan gerust aan je reumatoloog, reumaverpleegkundige of apotheker.


Colofon

De teksten in deze medicatiefolder zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR), reumatologie netwerk Zuid-Oost Nederland en ReumaNederland.

ReumaNederland

Postbus 59091
1040 KB Amsterdam

t 020 589 64 64

info@reumanederland.nl
www.reumanederland.nl
 Facebook.com/reumanederland

november 2020

Copyright

Informatie uit deze folder hergebruiken/delen is toegestaan mits de bron (ReumaNederland) wordt genoemd.