




Upadacitinib

Rinvoq®



Inhoudsopgave

- 3 Hoe werkt upadacitinib?
- 3 Voor welke aandoeningen gebruik je upadacitinib?
- 3 Hoe moet ik het gebruiken?
- 3 Hoe bewaar ik upadacitinib?
- 3 Welke bijwerkingen kan ik krijgen?
- 4 Zijn er controles nodig als ik upadacitinib gebruik?
- 4 Kan ik upadacitinib gebruiken met andere medicijnen?
- 4 Wat moet ik nog meer weten?
- 5 Meer informatie of vragen?

Disclaimer

Aan deze folder kun je geen rechten ontleen.
Controleer het altijd met de tekst in de bijsluiters die je bij je medicijn hebt gekregen. Neem bij vragen of onduidelijkheden over het medicijn contact op met je behandelend arts.

Hoe werkt upadacitinib?

Als je een vorm van ontstekingsreuma hebt, is er een fout in je afweersysteem (immuunsysteem) ontstaan. Je afweersysteem is ontregeld en slaat als het ware 'op hol'. Je lichaam denkt dat goede (lichaamseigen) cellen kwade indringers zijn en je afweersysteem wil die indringers verdrijven. Hierdoor komen bepaalde stoffen vrij waardoor ontstekingen ontstaan in gewrichten, pezen, spieren of organen. Dit kan in verschillende plaatsen van het lichaam gebeuren. Bij reumatische aandoeningen zijn dit vaak de gewrichten.

Upadacitinib is een medicijn dat deze afweerreactie onderdrukt en behoort tot de zogenaamde JAK (Janus-kinase) remmers. Upadacitinib remt specifieke signalen in de cel waardoor de productie van ontstekingsfactoren afneemt. Hierdoor vermindert de pijn, zwelling en stijfheid van je gewrichten waardoor er op langere termijn minder kans op gewrichtsschade is. De werking van upadacitinib treedt op na 8 tot 12 weken. Soms duurt het echter langer en bij sommige mensen werkt het medicijn helaas niet of onvoldoende.

Voor welke aandoeningen gebruik je upadacitinib?

Je arts schrijft je upadacitinib voor als je reumatoïde artritis hebt, of op röntgenfoto's zichtbare ('radiografische') axiale spondyloartritis hebt, zoals de ziekte van Bechterew.

Hoe moet ik het gebruiken?

Upadacitinib is verkrijgbaar in tabletten van 15 mg met gereguleerde (geleidelijke) afgifte. Je arts spreekt met je af welke dosering je gaat gebruiken. De gebruikelijke dosering is 1 maal daags 15 mg. Het zijn tabletten met vertraagde afgifte. Dit betekent dat de werkzame stof na innemen beetje bij beetje vrijkomt. Het is daarom belangrijk om elke tablet in zijn geheel in te nemen en deze niet te halveren of op de tablet te kauwen.

Als je aandoening rustig is, zal je arts samen met je bespreken om de dosering te verlagen en als het kan de upadacitinib zelfs te stoppen.

Hoe bewaar ik upadacitinib?

Upadacitinib tabletten bewaar je in de originele verpakking bij een temperatuur lager dan 30°C.

Welke bijwerkingen kan ik krijgen?

De apotheker geeft je altijd een bijsluiter mee. Lees deze bijsluiter goed. Je leest in de bijsluiter een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen, van zeer vaak tot zeer zelden. Het is mogelijk dat je een bijwerking krijgt, maar dat hoeft niet.

Hieronder lees je welke belangrijke bijwerkingen kunnen voorkomen bij upadacitinib gebruikers:

- Infecties zoals neusverkoudheid, gordelroos of blaasontsteking komen regelmatig voor. Als je deze klachten hebt, neem dan contact op met je (huis)arts.
- Bijwerkingen van organen: bijwerkingen die je zelf niet merkt maar je arts via bloedonderzoek wel in de gaten houdt, zoals afwijkingen van de leverfunctie, nierfunctiestoornissen en afwijkingen in het bloedbeeld.
- Infecties: upadacitinib remt je afweersysteem. Hierdoor wordt ook jouw afweer tegen infecties geremd. Je kunt dus makkelijker een infectie krijgen en soms verlopen infecties ook heftiger. Als je een gewone verkoudheid hebt zonder koorts, dan kun je upadacitinib gewoon door blijven gebruiken. Als je een infectie met koorts hebt of je ziek voelt, mag je meestal (tijdelijk) geen upadacitinib gebruiken. Koorts is vaak een teken van een infectie of ontsteking in je lichaam. Neem dan altijd contact op met je reumatoloog, reumaverpleegkundige of huisarts.

- Bij mensen met een verhoogd risico op stolsels in het bloed (trombosebeen en hartinfarct) wordt upadacitinib afgeraden. Dit geldt met name als je ook andere risicofactoren hiervoor hebt, zoals roken of als je eerder een hartinfarct hebt gehad. Neem contact met je huisarts op bij pijn op de borst, benauwdheidsklachten of zwelling van je been.
- Bij mensen boven de 65 jaar oud of andere risicofactoren voor kanker wordt upadacitinib afgeraden vanwege een verhoogde kans op kanker, in het bijzonder long- en lymfeklierkanker.

Zijn er controles nodig als ik upadacitinib gebruik?

Voordat je begint met upadacitinib wordt er eerst gekeken of je geen (sluimerende) infectie onder de leden hebt. Denk aan tuberculose (TBC) of een leverontsteking (hepatitis). Om tuberculose uit te sluiten krijg je eventueel een Mantoux-test en/of een bloedonderzoek en een röntgenfoto van de longen.

Soms is een bepaalde inenting (vaccinatie) voor het starten met upadacitinib nodig. Je arts bespreekt dit met je.

Als je start met upadacitinib laat je arts je bloed (in het begin) regelmatig controleren via het bloedprikken. Zo kan je arts goed in de gaten houden hoe je lichaam reageert op upadacitinib. Ook bij een verandering van de dosering zal er extra bloedonderzoek plaatsvinden.

Kan ik upadacitinib gebruiken met andere medicijnen?

Upadacitinib gebruik je bij reumatoïde artritis, soms gecombineerd met methotrexaat maar dit is niet noodzakelijk. Je kunt upadacitinib echter niet met alle reumaremmende medicijnen combineren. Je reumatoloog beoordeelt welke reumamedicijnen je kunt blijven gebruiken.

Het is verstandig altijd aan je arts en je apotheker te vertellen welke medicijnen je gebruikt of als er iets aan je medicijngebruik verandert.

Wat moet ik nog meer weten?

Alcohol Er is geen bezwaar als je (matig) alcohol gebruikt tijdens behandeling met upadacitinib.

Autorijden Upadacitinib veroorzaakt geen sufheid of slaperigheid. Er is geen bezwaar tegen autorijden als je upadacitinib gebruikt.

Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen Ga je naar de tandarts voor een ingreep of word je geopereerd? Geef dan aan dat je upadacitinib gebruikt omdat er misschien een verhoogd risico op infecties is na een operatie. Overleg met je behandelaar of het nodig is upadacitinib tijdelijk te stoppen. Wij adviseren om je (tand)arts op de hoogte te brengen dat je upadacitinib gebruikt zodat deze zo nodig maatregelen kan nemen.

Reizen Overleg met je arts of en hoe je mag reizen. Bij reizen naar het buitenland is het raadzaam een actueel verzicht van je medicijnen mee te nemen, het medicijnpaspoort. Daarin staat dat je upadacitinib vanwege medische noodzaak gebruikt. Dit paspoort kun je krijgen bij je apotheek of eventueel bij je behandelaar.

Vaccinaties Als je begint met upadacitinib zal je behandelend arts je waarschijnlijk aanraden om een jaarlijkse griepvaccinatie te nemen omdat je door upadacitinib kwetsbaarder bent voor infecties zoals de griep.

Heb je een andere vaccinatie dan de griepvaccinatie nodig? Overleg dan altijd van tevoren met je reumatoloog, apotheker of huisarts.

Gebruik je upadacitinib dan is een inenting met een levend vaccin af te raden. Denk aan het bof-mazelen-rode hond- (BMR-), gele koorts- of poliovaccin. Overleg met je arts wanneer voor jou het beste moment is om je te laten vaccineren/inenten. Eventueel moet je dan (tijdelijk) stoppen met je medicatie. Het is verstandig dit ruim van te voren te regelen.

Heb je plannen om in de (nabije) toekomst een verre reis te maken? Als je op reis gaat heb je soms een inenting nodig. Bespreek dit dan vóór het starten van upadacitinib met je behandelaar. Bepaalde vaccinaties werken minder goed tijdens het gebruik van upadacitinib.

Bespreek ook het risico op tbc-besmetting met je reumatoloog of de GGD-arts van het reizigersspreekuur voordat je naar verre landen reist.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding Heb je een kinderwens of ben je (onverwacht) zwanger, vertel dit dan aan je arts. Je arts zal dan samen met jou beslissen wat je het beste aan je medicijngebruik kan veranderen als dat nodig is.

Van upadacitinib is niet bekend of het de vruchtbaarheid beïnvloedt. Er is weinig informatie over de effecten van upadacitinib tijdens de zwangerschap. Upadacitinib mag je daarom niet tijdens de zwangerschap gebruiken.

Het is niet bekend of dit geneesmiddel in de moedermelk overgaat daarom mag je geen borstvoeding geven als je upadacitinib slikt.

Meer informatie of vragen?

Als je nog vragen hebt, stel ze dan gerust aan je reumatoloog, reumaverpleegkundige of apotheker.


Colofon

De teksten in deze medicatiefolder zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR), reumatologie netwerk Zuid-Oost Nederland en ReumaNederland.

ReumaNederland

Postbus 59091
1040 KB Amsterdam

t 020 589 64 64

info@reumanederland.nl
www.reumanederland.nl
 Facebook.com/reumanederland

december 2022

Copyright

Informatie uit deze folder hergebruiken/delen is toegestaan mits de bron (ReumaNederland) wordt genoemd.