




# Teriparatide

Forsteo®  
Movymia®



# Inhoudsopgave

- 3 Hoe werkt teriparatide?
- 3 Voor welke aandoeningen gebruik je teriparatide?
- 3 Hoe moet ik het gebruiken?
- 3 Hoe bewaar ik teriparatide?
- 3 Welke bijwerkingen kan ik krijgen?
- 3 Zijn er controles nodig als ik teriparatide gebruik?
- 4 Kan ik teriparatide gebruiken met andere medicijnen?
- 4 Wat moet ik nog meer weten?
- 4 Meer informatie of vragen?

## Disclaimer

Aan deze folder kun je geen rechten ontleen.  
Controleer het altijd met de tekst in de bijsluiter die je bij je medicijn hebt gekregen. Neem bij vragen of onduidelijkheden over het medicijn contact op met je behandelend arts.

## Hoe werkt teriparatide?

Teriparatide is een medicijn dat je door je arts krijgt voorgeschreven als je osteoporose (botontkalking) hebt. Teriparatide is een medicijn dat lijkt op een hormoon dat in je lichaam wordt gevormd door de bijnier (parathormoon, PTH). Teriparatide stimuleert de botvorming door het activeren van botopbouwende cellen. Hierdoor verbetert de botdichtheid en de structuur van het bot. Het bot wordt sterker en op deze manier neemt de kans op een botbreuk af.

## Voor welke aandoeningen gebruik je teriparatide?

Je krijgt het middel doorgaans voorgeschreven als je:

- ondanks eerder medicijnen tegen osteoporose (bijvoorbeeld een bisfosfonaat als alendroninezuur) toch een bot breekt of wervelinzakkingen hebt
- de andere medicijnen tegen osteoporose niet goed verdraagt
- ernstige mate van osteoporose hebt

## Hoe moet ik het gebruiken?

Teriparatide gebruik je via een onderhuidse (subcutane) injectie. Je kunt jezelf injecteren. In het ziekenhuis of bij de apotheek krijg je uitleg hoe je dit het beste kan doen. Als je het vervelend vindt om jezelf een injectie te geven, vraag dan een familielid of andere bekende dit bij je te doen. Hij of zij krijgt dan ook een instructie.

De gebruikelijke dosering van teriparatide via een onderhuidse injectie is 1 maal per dag 20 microgram. Je mag dit medicijn maximaal 24 maanden in je hele leven injecteren.

## Hoe bewaar ik teriparatide?

Teriparatide bewaar je in de koelkast bij een temperatuur tussen de 2°C en 8°C. Als het tijd is om te injecteren, mag je teriparatide direct injecteren als het uit de koelkast komt. Mocht het injecteren dan gevoelig zijn, dan mag je de injectiespuit 30 minuten voor toediening uit de koelkast halen om op kamertemperatuur te laten komen. Leg teriparatide direct na het injecteren terug.

## Welke bijwerkingen kan ik krijgen?

De apotheker geeft je altijd een bijsluiting mee. Lees deze bijsluiting goed. Je leest in de bijsluiting een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen, van zeer vaak tot zeer zelden. Het is mogelijk dat je een bijwerking krijgt, maar dat hoeft niet.

Hieronder lees je welke belangrijke bijwerkingen kunnen voorkomen bij teriparatide gebruikers:

- griepverschijnselen zoals spier- en gewrichtspijn
- hoofdpijn, (draai-)duizeligheid, flauwvallen
- zenuwpijn in de bil en/of het been
- misselijkheid, braken en/of maagzuurbranden
- hartkloppingen, kortademigheid
- allergische reacties: wanneer je overgevoelig bent voor teriparatide kun je een allergische reactie krijgen. Denk aan (nieuwe) huidafwijkingen, koorts of benauwdheid. Neem dan zo snel mogelijk contact op met je huisarts, reumaverpleegkundige en/of behandelaar.

## Zijn er controles nodig als ik teriparatide gebruik?

Voordat je begint met teriparatide wordt eerst je nierfunctie en het calciumgehalte in je bloed gecontroleerd. Als er grote problemen zijn met je nierfunctie of wanneer je een hoge hoeveelheid calcium (kalk) in je bloed hebt, krijg je het medicijn niet.

# Kan ik teriparatide gebruiken met andere medicijnen?

Voorzichtigheid is geboden als je teriparatide in combinatie met digoxine (Lanoxin) gebruikt. Als je alleen hoog calciumgehalte in je bloed hebt, kan het zijn dat de hoeveelheid digoxine in je bloed te hoog wordt.

Je arts zal je meestal adviseren om calciumtabletten (kalk) en/of vitamine D tabletten te gebruiken gedurende de behandeling met teriparatide. Volg deze adviezen goed op. Zo voorkom je problemen door een te laag calcium (kalk)gehalte in je bloed tijdens de behandeling met teriparatide.

Het is verstandig altijd aan je arts en je apotheker te vertellen welke medicijnen je gebruikt of als er iets aan je medicijngebruik verandert.

## Wat moet ik nog meer weten?

**Alcohol** Er is geen bezwaar als je (matig) alcohol gebruikt tijdens behandeling met teriparatide.

**Autorijden** Er is geen bezwaar tegen autorijden, fietsen, besturen van een scootmobiel of machine tijdens gebruik van teriparatide.

**Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen** Ga je naar de tandarts voor een ingreep of word je geopereerd? Geef dan aan dat je teriparatide gebruikt zodat je arts zonodig maatregelen kan nemen.

Het is verder niet noodzakelijk de teriparatide te stoppen voor een operatieve ingreep.

**Reizen** Als je op reis gaat, neem dan teriparatide gekoeld in een koeltasje mee in je handbagage. Bewaar de teriparatide op je verblijfadres zoals je dat thuis ook doet, dus in de koelkast bij een temperatuur van 2-8°C.

Bij reizen naar het buitenland is het raadzaam een actueel overzicht van je medicijnen mee te nemen, het medicijnpaspoort. Daarin staat dat je teriparatide met bijbehorende injectiespuiten vanwege medische noodzaak gebruikt. Dit paspoort kun je krijgen bij je apotheek of eventueel bij je behandelaar.

**Vaccinaties** Je kunt je zonder problemen laten vaccineren tijdens het gebruik van teriparatide.

**Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding** Heb je een kinderwens, overleg dit dan geruime tijd voordat je zwanger wilt worden met je reumatoloog. Bespreek het ook met je arts als je onverwacht zwanger bent. Je arts zal in deze situaties samen met jou beslissen wat je het beste aan je medicijngebruik kunt veranderen.

Van teriparatide is onbekend wat de effecten zijn op de vruchtbaarheid en de zwangerschap. Tijdens het gebruik van teriparatide is daarom het advies om betrouwbare anticonceptie te gebruiken en om geen teriparatide tijdens de zwangerschap te gebruiken.

Het is niet bekend of dit geneesmiddel in de moedermelk overgaat daarom mag je geen borstvoeding geven als je teriparatide gebruikt.

## Meer informatie of vragen?

Als je nog vragen hebt, stel ze dan gerust aan je reumatoloog, reumaverpleegkundige of apotheker.

# Colofon

De teksten in deze medicatiefolder zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR), reumatologie netwerk Zuid-Oost Nederland en ReumaNederland.

## ReumaNederland

Postbus 59091  
1040 KB Amsterdam

t 020 589 64 64

[info@reumanederland.nl](mailto:info@reumanederland.nl)

[www.reumanederland.nl](http://www.reumanederland.nl)

[www.reuma.nl](http://www.reuma.nl)

 [Facebook.com/reumanederland](https://www.facebook.com/reumanederland)

juli 2023

## Copyright

Informatie uit deze folder hergebruiken/delen is toegestaan mits de bron (ReumaNederland) wordt genoemd.